



**Thrombosis** Canada  
**Thrombose** Canada

## Vous êtes atteint d'une TVP (thrombose veineuse profonde) du bras

### Qu'est-ce qu'une TVP du bras?

Une thrombose veineuse profonde du bras se caractérise par la présence d'un caillot sanguin dans une veine profonde d'un bras.

### Pourquoi les TVP du bras sont-elles importantes?

Les TVP du bras peuvent causer de l'enflure et de la douleur à court et à long terme dans le bras.

Dans de rares cas, le caillot peut migrer vers un poumon (embolie pulmonaire) et causer la mort.

### Qu'est-ce qui cause les TVP du bras?

La cause la plus fréquente des TVP du bras est la présence d'un cathéter intraveineux (i.v.) ou d'un fil de stimulateur cardiaque dans une des veines du bras ou du cou.

La grosse veine du bras est parfois comprimée à son arrivée dans la poitrine – ce qui peut être lié à des efforts physiques importants ou à l'étranglement de la jonction de la veine du bras avec le thorax (syndrome de la traversée thoracobrachiale).


*Demandez à votre médecin quels sont les autres facteurs de risque de la TVP du bras.*

### Traitement

- La TVP du bras est traitée par des anticoagulants (médicaments qui « éclaircissent » le sang).
- Ces médicaments peuvent être administrés sous forme de comprimés ou par injections.
- La durée du traitement dépend du risque de formation d'un autre caillot sanguin et du risque de saignement.
- Si la cause de votre TVP est la présence d'un cathéter intraveineux, vous serez traité jusqu'au moment du retrait du cathéter ou au moins pendant 3 mois.
- Les saignements constituent le principal effet secondaire :
  - Mineurs (nez, gencives, ecchymoses)
  - Majeurs (crachements de sang, sang dans les vomissements, l'urine ou les selles, selles noires)

### Quels sont les symptômes d'une TVP du bras?

- Enflure d'un bras
- Douleur sur la face interne d'un bras
- Rougeur et chaleur du bras
- Vaisseaux sanguins plus volumineux ou plus apparents sous la peau de la partie supérieure du bras et de la poitrine



### Message à retenir

- La cause d'une TVP du bras est généralement connue.
- Le traitement anticoagulant doit être pris régulièrement tel que prescrit par le médecin.
- Consultez votre médecin si vous présentez de nouveaux symptômes de caillot sanguin ou de saignement majeur.

Suivez-nous sur Twitter : @ThrombosisCan

Téléchargez notre application dans les boutiques iTunes, Google Play et Windows

Courriel : [info@thrombosiscanada.ca](mailto:info@thrombosiscanada.ca)  
[www.thrombosiscanada.ca](http://www.thrombosiscanada.ca)

**ClotsMatter.ca**  
THROMBOSIS ADVOCATES